

NOTE PRÉLIMINAIRE SUR LES BACCHARIDINAE DE L'HERBIER
DE GLAZIOU AU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
(PARIS).

Par le Fr. TEODORO F. C. S.

C'était en 1860 A. F. M. GLAZIOU, architecte-paysagiste français, se trouvait au Brésil à Rio de Janeiro occupé à la réalisation d'un jardin public, genre « Mabilles » et « Château de Fleurs » de Paris.

La visite à Rio de Janeiro de l'Archiduc Maximilien d'Autriche permit au gouvernement brésilien de constater le besoin d'urbanisation du fameux « Passeio Publico » et c'est M. GLAZIOU qui fut chargé de projeter et faire exécuter un jardin public « anglais » comme étant le genre le plus naturel, le plus libre, produisant les plus agréables et les plus parfaites illusions. La Science Botanique, en plus du sens artistique, étant le grand instrument de ce travail devint la passion de GLAZIOU.

L'architecte-paysagiste français réussit à merveille et « La Lapa », la « Praça Republica » et la « Quinta Boa Vista » sont encore à Rio-de-Janeiro un éclatant témoignage de la compétence professionnelle de GLAZIOU. Cette compétence fut très estimée de Sa Majesté l'Empereur des Brésiliens Don Pedro II, qui nomma GLAZIOU jardinier en chef des jardins et des parcs impériaux : ce fut le commencement de la magnifique carrière de GLAZIOU.

Pour la Botanique, au Brésil, ce fut une aubaine ; car, comme GLAZIOU lui-même l'écrivait plus tard,

... dans le cours de mes explorations si souvent répétées aux mêmes endroits dans les Etats de Rio-de-Janeiro, de São Paulo et de Minas Geraes surtout, je pus recueillir plus de douze mille espèces de plantes occupant les numéros d'ordre de 1 à 22770, ayant environ 1000 numéros bisés. Tous ces végétaux, entre lesquels il y a des centaines d'espèces nouvelles et beaucoup de genres nouveaux, furent libéralement distribués entre les principaux herbiers d'Europe et de l'Amérique du Sud : Paris, Saint-Petersbourg, Kew, Berlin, Copenhague, Genève, Bruxelles, Stockholm, Montpellier, Rio-de-Janeiro, etc...

Depuis 1861 jusqu'à 1895 il ne cessa de s'occuper de la Flore Brésilienne. Aussi on peut affirmer en toute vérité que le plus grand monument de Phytographie, la « Flora Brasiliensis » de Ph. von MARTIUS doit à GLAZIOU une remarquable contribution ; c'est

pourquoi dans n'importe quelle famille de plantes au Brésil une connaissance approfondie n'est guère possible sans connaître l'Herbier de GLAZIOU.

M'occupant très spécialement des *Baccharidinae* (*Compositae*) il me fallait connaître l'Herbier de GLAZIOU et c'est à la bienveillance du personnel du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, en particulier de la Section de Botanique-Phanérogamie, et très spécialement au dévouement du Sous-Directeur du Laboratoire de Physique Appliquée, M. Yves LE GRAND, actuellement détaché à l'Université du Brésil, qu'il m'a été possible d'étudier une partie des *Baccharidinae* de l'Herbier de GLAZIOU, donné au Muséum par M^{me} SIMARD, sa fille, en 1907.

* * *

Le matériel de l'Herbier de GLAZIOU, que j'ai eu à étudier, comprend 69 numéros, dont 54 de GLAZIOU lui-même, 7 de REGNELL, 1 de WARMING, 2 de ULE, 1 de NADEAUD, 1 de MOSEN, 3 de RIEDEL.

Les *Baccharidinae* de l'Herbier de GLAZIOU furent étudiées en partie par BAKER, le monographe des *Composées* de la « Flora Brasiliensis » et aussi par HEERING, le spécialiste qui le premier se soit occupé du genre *Baccharis*. Aussi la liste que je communique à la suite comprendra la détermination de BAKER, de HEERING et de GLAZIOU lui-même, lesquelles déterminations précéderont celle de l'auteur chaque fois qu'il y aura lieu.

Voici quelques numéros sur lesquels il convient d'insister :

171. *Baccharis Lundii* DC (BAKER, in Fl. Br.).
B. trinervis Pers (GLAZIOU, in Herb.).
B. Lundii DC (det. TEODORO).
539. *Baccharis trinervis* var. *rhexioides* Baker (BAKER, in Fl. Br.).
B. trinervis Pers (GLAZIOU, in Herb.).
B. rhexioides Kunth (det. TEODORO).
553. *Baccharis trinervis* Pers (BAKER, in Fl. Br.).
B. trinervis var. *rhexioides* Baker (GLAZIOU, in Herb.).
B. rhexioides Kunth (det. TEODORE).
555. *Baccharis dracunculifolia* DC (BAKER, in Fl. Br.).
B. rufescens var. *tenuifolia* Baker (GLAZIOU, in Herb.).
B. dracunculifolia DC (det. TEODORO).
2614. *Baccharis vernonioides* DC (GLAZIOU, in Herb.).
Vernonia sp. (det. TEODORO).
2625. *Baccharis oxydonta* var. *punctulata* Baker (BAKER, in Fl. Br.).
B. trinervis var. *cinerea* Baker (GLAZIOU, in Herb.).
B. punctulata DC (det. TEODORO).
4849. *Baccharis calvescens* DC (BAKER, in Fl. Br.).
B. ramosissima Gardn. (GLAZIOU, in Herb.).
B. calvescens f. *typica* Heering (HEERING, in S. und P.).
Eupatoriaceae sp. (det. TEODORO).

7701. *Baccharis retusa* DC (BAKER, in Fl. Br.).
Baccharis reticularia DC (GLAZIOU, in Herb.).
B. retusa DC (det. TEODORO).
7724. *Baccharis reticularia* var. *polyneura* Sch. Bip (GLAZIOU, in Herb.).
Vernonia sp. (det. TEODORO).
7725. *Baccharis reticularia* var. *polyneura* Sch. Bip. (GLAZIOU, in Herb.).
Vernonia sp. (det. TEODORO).
8130. *Baccharis myriocephala* Baker (BAKER, in Fl. Br.).
B. myriocephala Baker (GLAZIOU, in Herb.).
B. pseudomyriocephala Teodoro (det. TEODORO).
8771. *B. cassinaefolia* DC (BAKER, in Fl. Br.).
B. coriacea Glaziou n. sp. (GLAZIOU, in Herb.).
B. cassiniifolia DC (det. TEODORO).
8777. *Baccharis cassinaefolia* var. *Riedelii* Baker (GLAZIOU, in Herb.).
B. daphnoides H. A. (det. TEODORO).
11006. *Baccharis rufescens* Sprengel (BAKER, in Fl. Br.).
B. fluminensis Glaziou sp. n. (GLAZIOU, in Herb.).
B. rufescens Sprengel (det. TEODORO).
11095. *Baccharis genistelloides* var. *brachystachys* Baker (GLAZIOU, in Herb.).
B. Glaziovii Baker (det. TEODORO).
11110. *Baccharis Dutaillyana* Glaziou sp. n. (GLAZIOU, in Herb.).
Vernonia sp. (det. TEODORO).
12831. *Baccharis Lundii* DC (GLAZIOU, in Herb.).
B. punctigera DC (det. TEODORO).
14003. *Conyza arguta* Less (GLAZIOU, in Herb.).
Baccharidastrum argutum (Less) Cabrera (det. TEODORO).
15008. *Conyza triplinervia* Less (GLAZIOU, in Herb.).
Baccharis punctulata DC (det. TEODORO).
15099. *Baccharis trinervis* Pers (GLAZIOU, in Herb.).
B. Lundii DC (det. TEODORO).
17065. *Baccharis glutinosa* Pers (GLAZIOU, in Herb.).
B. lanceolata Kunth (det. HEERING).
B. lanceolata Kunth (det. TEODORO).
19553. *Baccharis tarchonanthoides* var. *albifolia* Glaziou var. n. (GLAZIOU, in Herb.).
B. tarchonanthoides DC ? non ! (det. TEODORO).

Leg. E. ULE :

1541. *Baccharis trinervis* Pers (GLAZIOU, in Herb.).
B. oxyodonta DC ((HEERING, in S. und P.).
B. oxyodonta DC (det. TEODORO).
1777. *Baccharis trinervis* Pers (GLAZIOU, in Herb.).
B. oxyodonta DC (HEERING, in S. und P.).
B. oxyodonta DC (det. TEODORO).

Leg. RIEDEL.

- s/n *Baccharis rufescens* var. *pedalis* Baker (GLAZIOU, in Herb.).
B. pedalis Sch. Bip. (det. TEODORO).